



INFORMÁCIÓ ÉS BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT GYÖKÉRKEZELÉSHEZ

Alulírott.....születési.idő:.....

cím.....

az alább leírtakat elolvastam, megértettem és tudomásul vettem.

Amennyiben Önnél mikroszkópos gyökérkezelést fogunk végezni, tájékoztatásul leírjuk összefoglalva egy pár sorban a legfontosabb információkat. További kérdésekkel nyugodtan forduljon a kezelőorvoshoz.

Gyökérkezelés akkor szükséges amikor a fogban található ideg (pulpa) begyullad vagy elhal. Gyakran erős fájdalommal jelentkezik (akut pulpitis) de észrevehetetlenül fájdalom nélkül is előfordulhat. Ilyenkor véletlenül vesszük észre például vitalitásvizsgálattal (hidegteszt) vagy röntgennel. A gyökérkezelés azon fogászati ellátások közé tartozik, amely a megbetegedett fog megtartásának utolsó lehetőségét rejti.

A gyökérkezelendő fogat egy kofferdámnak (nyálrekesz) nevezett gumilepedővel izoláljuk a szájtól. Ez megóvjaa a páciens attól, hogy esetleg lenyeljen egy gyökérkezelő műszert (tűt) vagy átöblítő folyadékot. Mindezek mellett garantálja, hogy a fogorvos sterilén tudjon dolgozni, kívülről a szájüreg felől ne vigyen be baktériumokat a gyökércsatornába. A kezelést érzéstelenítésben végezzük, a begyulladt ideget a fog belsejéből eltávolítjuk, a gyökércsatornákat vékony tűkkel (fájlokkal) kitisztítjuk, fertőtlenítjük.

A gyökérkezelések között gyógyszerrel (kálciumos paszta) látjuk el a gyökércsatornákat majd ideiglenesen tömjük, amíg a végleges gyökértömés elkészíthető. Ennek feltétele, hogy a fog panaszmentes és teljes egészében steril legyen. A gyökértömést guttaperchával és különböző híg pasztákkal, a helyzetnek megfelelő technikával végezzük el. A kezelés alatt több röntgenfelvételt készítünk, attól függően, hogy hány gyökércsatorna van a fogban (akár négy), vagy mennyire görbék, ezért szükséges lehet hosszadalmas, többszöri kezelésekre visszajárni. Ha időközben a kezelések időtartama alatt panasz lépne fel, a kezelés teljes időtartama elhúzódhat, de az is kiderülhet, hogy a fog nem megtartható és mégis el kell távolítani (pl. megrepedt a fog).

Mint minden fogászati beavatkozás során, így a gyökérkezelések alkalmával is, a legnagyobb odafigyelés mellett is felléphetnek komplikációk:

- bedagadhat vagy panaszos maradhat a kezelt fog. Ez előfordulhat a kezelést követő időpontok között, vagy hosszabb idő elteltével a kezelés végén.
- megsérülhet a gyökércsatorna az eszközök vagy a gyökércsap által
- beletörhet egy gyökérkezelő eszköz a csatornába
- elrepedhet a fog

- ritkán az alsó állcsontban futó ideg megsérülhet, vagy megnyílhat a felső állcsontban található arcüreg, ha a kezelendő fog nagyon közel található ezekhez a képletekhez
- túltömhető a gyökércsatorna

A helyi érzéstelenítés szövődményei:

- allergiás reakció- előfordulása rendkívül ritka
- helyi vérömleny akkor keletkezhet, ha egy kis ér vagy érfonat megsérül az injekció beadása közben, arcduzzanatot okoz, kezelést nem igényel egy-két hét alatt magától rendeződik.
- idegsérülés-alsó érzéstelenítésnél fordulhat elő, ritkán. Hónapokig tartó érzésvizsgálat okozhat az alsó ajak megfelelő oldalán. Általában néhány hónap alatt teljesen regenerálódik az ideg.
- szájnýtási korlátozottság- alsó érzéstelenítés után 1-2 napig állhat fenn.
- átmeneti, féloldali arcbénulás szerű tünetek- az arc mimikai izmait ellátó ideghez is jut az érzéstelenítő szerből. Az állapot 2-3 óra alatt rendeződik.
- múló rosszullét, ájulás ami a félelem pszichológiai élményével kapcsolatos. Gyakran a rosszullétek az érzéstelenítő beadása után jelentkeznek, ami kapcsolatba hozható az injekciótól való szorongással de kiválthatja az érzéstelenítő szer érpályába kerülése is. Az eszméletvesztés megelőzhető, a rosszullét pár percen belül megszűnik.

A gyökérkezeléshez szájsebészeti beavatkozások néha alternatívaként szükségesek lehetnek. A beteg gyökércsúcsot leválasztjuk (rezekció) vagy többgyökerű fogaknál a gyökér egy részét eltávolítjuk. Legvégül, ha eredménytelen minden beavatkozás már csak a fogeltávolítása marad.

Bizonyos esetekben a kezelés során a fog gyulladása az arcüregre vagy az alsó állcsont idegére is kiterjedhet, ezáltal az esetleg addig panaszmentes fognál fájdalom, ödéma vagy gennyképződés (abszcesszus) jelentkezhet.

A kezelést követően, miután elmúlt a zsibbadás (kb.2 óra) enyhe vagy középérős fájdalom lehetséges a kezelt fognál, melynek intenzitása fokozatosan elmúlik. A fájdalom eltarthat 2-3 napot, ajánlatos fájdalomcsillapító szedése (Cataflam, Diclofenac).

Nagyon erős fájdalomnál, vagy ha erősödik a fájdalom, kérjük jelentkezzen a kezelés folytatására. Gyökérkezelést követően a fog koronai része elszíneződhet. Sikeres gyökérkezelést követően a cél, hogy a fog hosszú távon funkcionáljon. Oldalsó fogaknál a korona részére inlay, onlay vagy korona készítése szükséges.

Kérjük Önt, hogy az aláírásával nyugtázza, hogy megértette a gyökérkezelés szükségességét, a komplikációkat, az alternatívákat és a kezelésbe beleegyezik.

A gyökérkezelés szükségességéről, a lehetséges komplikációkról, az alternatívákról informáltak.

Beleegyezésem adom a javasolt kezelésbe.

Dátum:

.....
Aláírás